

「医療ビッグデータ時代の精密医療と 計算創薬」

東京医科歯科大学 名誉教授（生命医療情報学）
東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 特任教授
機構長特別補佐

田中 博



ビッグデータを取り巻く状況と 医療のパラダイム転換

医療の「ビッグデータ革命」

～何が新しいのか～

1) 臨床診療情報

- 従来型の医療情報
 - 臨床検査、医用画像、処方、レセプトなど

2) 社会医学情報

- 従来型の社会医学情報
 - 疫学情報・集団単位での疾患罹患情報

3) 新しい種類の医療ビッグデータ

- 網羅的分子情報・個別化医療
 - ゲノム・オミックス医療
 - システム分子医学・Precision Medicine
- 生涯型モバイル健康管理 (mHealth)
 - ウェアラブル・生体センシング

旧来のタイプの
医療データの
大容量化

新しいタイプの
医療ビッグデータ

医療の「ビッグデータ革命」

～何が新しいのか～

＜目的もデータ形式も従来型と違う＞

従来の医療情報の「ビッグデータ」

Big “Small Data”

医療情報・疫学調査 属性数：10項目程度



- 目的：Population MedicineのBig Data
集合的見地から「医療の集合的法則」を見る

ゲノム・オミックス医療, mHealth の
ビッグデータ

Small “Big Data”

1 個体に関するデータ属性数が膨大

- 属性に比べて個体数が少数
- 従来の統計学が無効 $p \gg n$
- 目的：Personalized Medicine のため
多様な個別化パターンを多数を集める



新しいデータ科学の必要性

わが国における従来型ビッグデータ

- 従来型電子化医療情報のビッグデータ
 - 患者診療電子化データをNation-wide（国規模）に蓄積した医療データベース
 - 日本版センチネル計画(2011～)
 - 米国のセンチネル計画（2008, HHS, FDA, 1億人データ）の日本版（10大学病院）
 - 薬剤投与履歴、アウトカム（副作用など）情報
 - NDB（ナショナルデータベース）
 - レセプト(2009年～)・特定健診(2008～)情報
 - レセプト情報（80億件以上、7000万件）
 - National Clinical Database：症例データベース（医師のみ：400万件）その他、各疾患領域で広がっている
 - 分譲可能な従来型コホート(JPHC,J-MCCなど後述)

医療の「ビッグデータ」革命は どんな既存のパラダイムに挑戦しているか

- **Population medicineのパラダイム転換**
 - <One size fits for all>の医療はもはや成り立たない
 - **Personalized (Precision) medicine**
 - 個別化医療を実現するために<個別化パターン>を網羅的に調べる：新しいタイプのビッグデータ
 - どこまでの粒度で個別化すればよいか
- **Clinical researchのパラダイム転換**
 - 臨床研究を科学にする従来の範型RCT
 - <statistical evidence based>
 - RCTの呪縛からの解放
 - 「標本」統計・「推測」統計学ではない臨床知識獲得法
 - **Real World Data: ビッグデータ知識獲得(BD2K)**

医療ビッグデータを 巡る状況(1)

High Throughput 技術発展による
ゲノム・オミックス医療情報の急増

ゲノム・オミックス・ビッグデータ を取り巻く状況


- 我が国では
 - まだゲノム・オミックス・ビッグデータの”波”は臨床現場には押寄せてはいない。
- 米国では、
 - 2010年のWisconsin小児病院の腸疾患小児の例から5年経て、多くの有名病院でClinical Seqが日常臨床化して、ゲノム/オミックス・ビッグデータの時代は始まっている。
- しかし、我が国でも
 - 幾つかのバイオバンクのゲノムコホートのデータ蓄積はすでに始まり、数年のうちに医療ビッグデータ時代が押し寄せるだろう。
 - それを向かえる対応を準備する必要がある

医療ビッグデータ時代の到来

クリニカル・シーケンシングの普及など


次世代シーケンサの臨床応用 全ゲノム解析 (WGS) 100Gb

米国では数十の著名病院で実施



DNA Sequencing Cost: the National Human Genome Research Institute

2000兆塩基 (2 Pb)
が登録 (NCBI:SRA)



ゲノム・オミックス情報の蓄積

従来型医療情報
との統合

クリニカル
フェノタイピング

臨床情報
形式化

医療ビッグデータ

学習アルゴリズム

ゲノム医療知識

人工知能



ゲノム医療の実践

医療ビッグデータ



MayoClinicでは
10万人患者WGS

ゲノム/オミックス医療－米国の状況

現状 米国ではすでに**数十の医療施設**で
ゲノム/オミックス医療が病院の日常臨床実践


NHGRI Working Groupのリスト

- Wisconsin大学病院
 - 原因不明の遺伝疾患の診断
- Vanderbilt大学病院PREDICT計画
 - 薬剤代謝酵素の多型性
- Mayo Clinicの臨床ゲノムシーケンス
 - がんおよび非常に稀な遺伝病原因探索
 - 10万人ゲノムDB
- その他、右表にあるように多数の病院
- 分子情報と臨床情報の融合を目的として統合データベース
 - Mofit Cancer Center (Oracle HRI)
 - 製薬会社Merkと病院の契約

Institution	Major Projects
MC Wisconsin	Using whole genome sequencing to establish diagnosis in patients with currently undiagnosed genetic disorders
Mount Sinai	<ul style="list-style-type: none"> • CYP2C19 testing for antiplatelet rx post percutaneous coronary intervention • Personalized decision support for CVD risk management incorporating genetic risk info
Northwestern	Using pharmacogenomics evidence (from GWA genotyping) to guide prescriptions in primary care and assess risk for other conditions such as HFE/hemochromatosis
Cleveland Clinic	Tumor-based screening for Lynch syndrome, endometrial cancer
UCSD	<ul style="list-style-type: none"> • Screening for actionable mutations in malignant gliomas and glioblastomas for biomarker based RCTs • Targeted rx (such as RET inhibitor) of metastatic solid tumors based on tumor mutation status
Morehouse	• Exome sequencing of 1200 early onset severe African American hypertension cases and 1200 controls
Duke	<ul style="list-style-type: none"> • Computer-based family hx collection and CDS tool with 1-yr follow-up for perceptions, attitudes, behaviors related to thrombosis and breast, ovarian, and colon cancer • SLC01B1*5 genotyping and statin adherence • Effect of genetic risk info on anxiety and adherence in T2DM

Institution	Major Projects
Alabama	Planning stages for projects in risk assessment, pharmacogenetic analysis, identification of families for further research
Baylor	Whole exome and whole genome sequencing in Mendelian disorders to improve diagnosis
Geisinger	<ul style="list-style-type: none"> • Selection for gastric bypass surgery vs other wt loss means based on genetic variants predictive of long-term benefit from surgery • IL28B variants and response to hepatitis C treatment • KRAS and BRAF mutational analysis in thyroid cancer patients
Ohio State	<ul style="list-style-type: none"> • Personalized genomic med study of CHF and HTN pts randomized to genetic counseling vs usual care • CYP2C19 testing in interventional cardiovascular procedures for clopidogrel
Harvard	Whole genome sequencing with integration in EMR and CDS; pilot of 3 patients to start
U Penn	Genotyping for assessment of MI risk in Preventive Cardiology program
St. Jude's	Pre-emptive PGx genotyping in children
Vanderbilt	Pre-emptive PGx genotyping for clopidogrel, warfarin, or high-dose simvastatin
U Maryland	Develop and apply evidence-based gene/drug guidelines that allow clinicians to translate genetic test results into actionable medication prescribing decisions
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • PGx driven selection/dosing of antidepressants • CYP2C19 genotyping for antiplatelet rx post PCI
Inter-Mountain	Tumor-based screening for Lynch syndrome

米国の医療Genome/Omics/BigDataの 状況遷移の全体把握



ゲノム配列解読の最初の臨床応用 Clinical Sequencing

Nic Volker



- Wisconsin 小児病院（全米4位）2009年、3才の男子。
- 2歳から原因不明の腸疾患で、腸のいたるところに潰瘍が発生。
- クローン病かと疑うが、クローン病の既報の遺伝子変異なし
- 2年間で130回の外科的切除手術を行うが再発を繰り返す。これ以上行う治療がなくなった(A. Mayer)
- Nicの全エキソンの配列を次世代シーケンサ決定
- MCWで見出された16000個のDNA配列異常を慎重に分析



XIAP (X連鎖アポトーシス阻害タンパク質遺伝変異 TGT(cysteine)→TAT(tyrosine) (203番目)
アポトーシスの阻害因子 免疫系が腸を攻撃する自己免疫を阻害 これまでのヒトゲノム配列で見出されていない ショウジョウバエからチンパンジー見いだせず

臍帯血による骨髄移植を実施（2010年6月）
2010年7月半ばには、食事が取れるまでに回復した。
現在は、普通の男子と変わらぬ健康な生活を送っている。



Medical College of Wisconsin, Human & Molecular Genetics Center
Howard Jacob
(a major mover of the whole field, Topol)

Wisconsin医科大学小児病院および Froedtert 病院のゲノム医療

- Genome sequencing program
 - Nic君に続いて（翌年3月まで6例）
 - 候補選択 (nomination)
 - 従来の検査・診察で診断困難
 - Multidisciplinary 患者選択委員会でレビュー
 - 6-8時間のアセスメントとカウンセリング
 - ゲノムシーケンスプログラムに登録
 - 32 全ゲノム, 550 全エキソーム (2015年4月まで)
 - アメリカ病理学会 (CAP)およびClinical Laboratory Improvement Amendments に
よって承認されたLabo(CLIA). 最初は外注。
 - 解析：in-houseのBioinformaticianで
 - 最初, 候補とした変異について調べ
 - つぎにincidental findingも含めて精査
 - ACGM勧告 (56遺伝子)

Wisconsin
小児病院



Wisconsin 医科大学 (MCW)



Froedtert 病院



その他の臨床ゲノムシーケンス実施病院

- Baylor医科大学病院

- Wisconsinに続いて臨床ゲノム配列解析
- 病院内にWhole genome laboratory 設立
(2011.Oct)
- In-houseでシーケンシング/変異分析ともに
- CAP/CLIA認証の検査室を病院内に立ち上げる。
そこでの配列解読
- 臨床分子遺伝学者によって解析・結果報告



- そのほか

- Washington大学、Partnerヘルスケア、
Geisinger clinic など多数続く、前スライド表

メイヨクリニック

個別化医療 (Individualized Medicine)

- 全患者に全ゲノム配列解析(WGS)あるいはエキソーム配列解析(WES)
- 10万人患者（診療圏）の全ゲノム・データベース構築
- eMERGE コンソーシアムの初期からのメンバー

- phase I (2007-11)から参加、phase II (2011-15)では
- 臨床現場におけるゲノム医療の実現
- 先制的ゲノム薬理学 (PGx) 検査 (Weinshilboum) とゲノム医療臨床支援 (CDS) が電子カルテEMRに装備
- RIGHT protocol: Right Drug, Right Dose, Right Timed Using



- “Center for Individualized Medicine”で特別に診断する


Clinical Sequencing

難治性がん

- 例 胆管がん


原因不明遺伝病

- “診断オデッセイ”



eMERGE計画
参加施設

薬剤代謝酵素多型性のゲノム医療実践 バンダービルト大学病院



■ PREDICTプロジェクト

34項目の薬剤代謝酵素CYP多型性判定Chip
医師の処方オーダー時に警告提示（2010から）

Pharmacogenomic Resource for
Enhanced
Decisions in Care and Treatment



HEO Popup

Clopidogrel Poor Metabolizer Rules

Genetic testing has been performed and indicates this patient may be at risk for inadequate anti-platelet response to clopidogrel (Plavix) therapy

This patient has been tested for CYP2C19 variants, and the presence of the *2/*2 genotype has identified this patient as a **poor metabolizer** of clopidogrel. Poor metabolizers treated with clopidogrel at normal doses exhibit higher rates of stent thrombosis/other cardiovascular events.

Treatment modification is recommended if not contraindicated:

- Prescribe prasugrel (EFFIENT) 10mg daily and stop clopidogrel (PLAVIX) startdate, 10 AM

Due to increased risk of bleeding compared to clopidogrel, prasugrel should not be given to patients:

- that have a history of stroke or transient ischemic attack *** Not known; please check StarPanel
- that are greater than 75 years of age
- whose body weight is less than 60 kg

Click here for [more information](#)

If prasugrel (EFFIENT) not selected, please choose desired action:

- Increase maintenance dose of clopidogrel (PLAVIX) 150 mg daily, startdate, 10AM
- Maintain requested daily dose of clopidogrel (PLAVIX) 75 mg daily, startdate, 10AM

If not using prasugrel, please select a reason:

- Contraindicated for prasugrel
- Potential side effects
- Patient opts for clopidogrel
- Other (Specify)

Click here for [more information](#)

Cancel Order

NOTE: The Vanderbilt P&T Committee has recommended that prasugrel (if not contraindicated) should replace clopidogrel for poor metabolizers; if this is not possible consider doubling the standard dose of clopidogrel (or, use standard dose clopidogrel). However, there is not a national consensus on drug/dose guidance in this population.

Back Home Close

クロピドグレル処方
電子カルテの警告画面
商品名プラビックス：抗血栓剤
ステント留置手術の後に処方

CYP2C19の多型性で*2/*2の場合は
代謝機能が低いので(poor metabolizer)
血栓が凝固する
薬剤投与の応答は不十分である

この患者の場合(*2/*2)プラスゲレル
(商品名エフィエント)に替えるか

分量を2倍にしると警告している

ゲノム・オミックス医療の基軸概念

3世代区分

第1 (生得的) ゲノム医療


- 生得的ゲノム情報の変異・多型性

第2 (後天的) オミックス医療

- 後天的体細胞の網羅的分子プロフィール

第3 システム分子(分子システム)医学

- 細胞分子ネットワークの歪み/構造変化



H.Tanaka:

”Genome and Omics Medicine

—Principles, Clinical Implementation and BigData Approach—

Springer 2016

網羅的分子医学 第1パラダイム

ゲノム医療 (1990~現在)

Manolio (2009)

- 「生得的な(germ-line) ゲノム変異や多型性に基づいた個別化医療

- 生得的ゲノム

- 全細胞で生涯を通じて同一99.5%は共通


- 疾患原因遺伝子(Disease causative gene)

- 家系調査/Linkage解析



- 1980年代から: ハンチントン病
 - CAGリピート, HTT遺伝子, 99%浸透率
 - その他にデシャンヌ型筋ジストロフィー, 嚢胞性線維症
 - 当時400程度のDNAマーカ ヒトゲノム解読計画へ

- 疾患感受性遺伝子(Disease susceptibility gene)

- 多型性: 一塩基多型(SNP), 3000万位,
 - そのほかにマイクロサテライト、CNVなど
 - 全ゲノム関連解析 (GWAS) 患者対照分析
 - 薬剤代謝酵素の多型性 (PGx)



単一分子へ起因する方法の限界



1塩基の変異が疾患や薬剤への応答性に関与する場合がある

網羅的分子医学 第2パラダイム オミックス医療 (2000~)

- 「後天的・疾病依存的に変化する網羅的分子病態像」






後天的体細胞ゲノム変化+ゲノム以外の疾患オミックスに基づく医療

- 疾患 オミックスプロファイルによる分子的病態像
 - 後天的ゲノム変異・遺伝子発現プロファイル・プロテオームなど、病態進行の段階に依存

- 疾患の進行度の評価 → 予測医療・先制医療

- Ongoing state of disease progressionを表現
- 臨床症状や病理変化より早く変化 Predictive Omics

乳がんの亜型と治療・予後




網羅的分子医学 第3パラダイム システム分子（分子システム）医学（2010～）

システム生物学の疾患への応用
「疾患をシステムとして理解する」

単因子性の疾患を除いて、大半の疾患は1個や2個の遺伝子の変異ではなく多数の遺伝子の変異やタンパク質の機能異常による分子パスウェイ/ネットワークの調節機能不全や歪み
distortion (dysregulation) of molecular network

個別化医療・予測医療・先制医療・創薬のための疾患のシステムの理解に基づく医療

疾患オミックス
(網羅的分子表現型
molecular phenome)
成り立たせる基底としての
「**細胞分子ネットワークの**
(分子システム) 構造変化」
疾病の理解における
第3のパラダイム



ゲノム・オミックス医療の臨床実装の現状

実施されているゲノム・オミックス医療

1. 病因未知の遺伝疾患のWGS/WESによる原因遺伝子変異の同定(undiagnosed disease)
Wisconsin大学病院、 Baylor大学病院
2. 難治性のがんのWGS/WESによるDriver 遺伝子変異の同定
Mayo Clinic, MD Anderson
3. 遺伝性がんの生得的な原因遺伝子
BRCA1/2などの診断
4. 薬剤代謝酵素の多型性診断と電子カルテへの実装 (DNAアレイ)
Vanderbilt大学病院・ Mayo Clinic

第1世代が殆んどである

米国のゲノムオミックス医療の 推進・評価組織

当初一番乗りを目指した病院別プロジェクト⇒
共通の課題を解決する国家ProjectやConsortiumへ

- **NACHGR** :
 - National Advisory Council on Human Genome Research : NHGRIが主導
 - **NACHGR working group**
 - "early adopter"を集めて個々の経験を共有し、まとめてゲノム医療の課題を検討する
- **EGAPP** :
 - CDCP (Center for Disease Control and Prevention) が設立(2005)
 - Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention
 - 遺伝子診断法の評価、臨床応用の適切性判断
- **CPIC: 薬理ゲノム学臨床実装コンソーシアム**
 - **Clinical Pharmacogenomics implementation Consortium,**
 - 薬理ゲノム研究ネットワーク (PGRN) のメンバ, PharmGKBのスタッフで構成,
 - 薬理ゲノムガイダンス(CPIC guideline) を臨床家、臨床検査室に提示し、PGx試験が広く臨床で用いられることを目的
- **ACGM** (American College of Medical Genetics and Genomics)
 - Incidental findingの推奨リスト (56遺伝子)

NIH「ビッグデータから知識へ」計画

“Big Data to Knowledge” (BD2K) initiative

- **BD2K: “Big Data to Knowledge” Initiative 開始**
 - 「データ・情報学に関するNIH長官諮問委員会」WG
 - 次世代シーケンサによるゲノム・オミックス医療の普及により、臨床シーケンス情報蓄積の大量化に対応して始まる
 - 研究費の配分 2013年に開始。計画実施予算は2014年から
 - **データ科学のための副長官** (Associate Director of Data Sciences) を任命 **Bourne, PhD.**
- **Francis Collins長官談「NIH全規模での優先計画」**
 - 生命医療研究に喫緊の重要性を持つ、指数的に増大する生命医療データを活用する
 - 「ビッグデータの時代は到来した」 (Collins)
 - NIHがこの革命を作り上げる。**様々な異なったデータ種類に対するアクセスの統合・分析**に主導的な役割を果たす。
- <http://bd2k.nih.gov>

NIH BD2K計画の実施


- 医療におけるデータ科学の全米COE創設
 - Center of Excellence in Data Science
 - Univ. Pitts: Center for causal modeling and discovery of biomedical knowledge from big data
 - UCSC: Center for big data in translational genomics
 - Harvard: Patient-centered information commons
 - その他、コロンビア大学、イリノイ大学など11施設 32M\$
- Data Scientist 人材養成への予算措置
- データ発見索引 DDI (Data Discovery Index) Consortium
 - Data discovery index coordination consortium (DDICC)
 - データベースカタログの発展・Pub MEDのDB版
 - UCSD: BioCADDIEを中心にDDI開発の準備を担当
 - BioCADDIE : Biomedical and healthCare Data Discovery and Indexing Ecosystem

関連プロジェクト eMERGE

- 前史 : Nat. Center for Biomedical Computing : i2b2 形式の医療データ
- Phase I (2007-2011)
 - 電子カルテから臨床phenotypingを行う
 - EMR : 臨床phenotypingとBiorepositoryに基づくGWASが可能か (EMR-based GWAS) 利用に関するELSI側面も検討
 - eMERGE-I: Mayo Clinic, Vanderbilt大学, Northwestern大学など5施設

- Phase II (2011-2015)

- 電子カルテと遺伝情報の統合(実装)
 - 電子カルテへのゲノム情報の統合
 - PGxの臨床応用に関する試行プロジェクト
 - 結果回付 Return of Result (RoR)
- 4施設がeMERGE-IIより加わる
 - 小児病院とMount Sinai/Gesinger



- CSER consortiumとliason

- “Clinical Sequencing Exploratory Research” コンソーシアム NHGRIにより予算化
- 臨床的転帰を改善するための全ゲノム/エキソーム解析

臨床データの表現型形式化 (Phenotyping) の問題



i2b2 (Informatics for Integrating Biology and the Bedside)

- 格納すべきあらゆる情報を主語 (subject) 述語 (predicate) 目的語 (object) のトリプレット (三つ組み RDF : resource description framework) で形式化、
- オントロジーとの組み合わせで検索可能とする、特徴的な設計
- Star Schema: データベーススキーマの1つ、その中心に位置する observation_fact テーブルに集約される。

tranSMART - トランスレーショナル生物医学研究のプラットフォーム

- tranSMART Foundationにより開発されているオープンソース(GPL3)のプラットフォーム
- 転帰 (outcome) などにより集団を抽出し、ヒートマップ、相関解析、クラスタ分析、主成分分析、生存時間分析などの解析が可能

Node	Description
Biomarker Data	Measurements of biomarkers such as RBM antigens, gene expressions, antibodies and antigens in ELISA tests, and SNPs.
Clinical Data	Primary and secondary endpoints, and other measurements from the study.
Samples and Timepoints	Tested samples (such as tissue or blood) and time periods when the samples were taken.
Scheduled Visits	Periodic stages of the trial during which patients are seen.
Design Factors	Compounds involved in the study, dosages, and regularity with which the compounds were administered. Note: With clinical trials, this node is typically named Treatment Groups.
Sample Factors	Patient information, such as demographics and medical history.



バイオ・医療におけるBig Dataの 構成要素

- 網羅的分子情報 (Genome/Omics)
 - ゲノム・オミックス情報、multi-omics
- 臨床環境表現型 (Phenotyping)
 - eMERGE-I, PheKB, EWAS
- 知識発見システム (Data Science)
 - Data-mining, Knowledge Discovery, 人工知能

医療におけるビックデータ

ゲノム情報 + 臨床・環境情報(EMR等)

知識発見(learning) システム

米国のBD2Kの幾つかの動き (1)

CancerLiQ

- ASCO(米国臨床癌学会)
- The ASCO **CancerLinQ** initiative
 - “Learning Health System”あるいは”**Rapid Learning**”の概念をがん治療において実現する。
 - データがバラバラの状態を改変、集合化
 - 診療の現場(EHR)から大量の診療データを集め分析する
 - 新しい臨床治験へのガイドライン検討
 - 病院の患者によって17万人のがん症例データベースを構築。各がんについて1~2万人の症例を集める
- 学習システムを構築し、仮説を生成する治療知識を供給する。統計学習、ニューロネットを駆使して学習。

BigDataにおけるLearning systemの不可欠性
- 2013年に、CancerLinQのプロトタイプを完成、10万人以上の乳がんを蓄積、完全規模へ継続構築中

米国のBD2Kの幾つかの動き (2)

米国研究施設とIBM Watson

- **Learning systemの不可欠性: IBM Watson**
 - 自然言語処理、大量データベース探索、確信度付き解答: Deep QAシステム (jeopardy)
 - MITのSTARTと呼ばれるオンライン自然言語QAシステム: 質問をシンプルな質問に分解
 - CMUのOpen Advancement of Question-Answering Initiative (OAQA) システムが骨格
 - 質問解答に最も適切なテキスト資料を特定する知識源拡張アルゴリズム。テキストから知識を自動的に抽出
 - 大規模情報抽出、構文解析、知識推論により大量の情報資料をシステムの一般知識情報源に変換
 - 自然言語理解に応用される統計学的学習理論 (例えば、カーネル法) が基礎
- **Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)**
 - The Oncology Expert Adviser software (OEA)
 - IBMワトソンの計算能力および自然言語処理技術と、MSKCCが持っている臨床知見 (分子・ゲノムデータ、がん病歴の膨大なリポジトリなど) を組み合わせ、個々の患者にとって最高の治療方針を決定するのに役立つ、最新の研究に基づいた詳細な診断情報や治療の選択肢を見出す
- **New York Genome Center**
 - がん専門医ががん患者に対してより良い個別ケアを提供できるよう支援するツールとしてゲノム研究専用デザインされたWatsonの試作システム
 - 最初の対象として脳腫瘍のglioblastoma (グリア芽細胞腫)、ゲノム配列と医療情報、医学文献から個別化治療を提案
- **その他のWatsonの応用**
 - Cleveland Clinic
 - 問題解決型学習プログラム、仮説的な臨床シミュレーションの中で、Watsonを対話的に利用して症例を分析。Watsonの技術を利用した共同型の学習教育ツール
 - MDA Anderson
 - 治験に適切な患者を診療情報から選別(clinical trial)

わが国での ゲノム・オミックス医療の臨床実装

(Clinical Implementation of Genomic Medicine)

- 研究費を用いた試行的ゲノム医療であるが、いくつかの医療施設でゲノム・オミックス医療が試行されている。
- がんの網羅的分子診断と個別化治療
 - 国立がん研究センター東病院
 - 遺伝子検査よりドライバー遺伝子の診断
 - 分子標的薬の治験グループに割当て
 - 静岡県立がんセンター
 - 上記と同様の内容のプロジェクト
- 先天性神経筋疾患
 - 東大病院ゲノム医学センター

ゲノム医療では、米国と水を空けられている。
しかし、Biobank/Genomic Cohortでは我が国の状況はそれほど遅れてはいない。

Biobankとゲノムコホート

• バイオバンクの目的・機能の変化

- 従来は再生医療のための生体標本や臨床研究の資料保存、近年はゲノム情報の収集が加わる
- **ゲノム/オミックス個別化医療、創薬の情報基盤**
 - **疾患型BioBank**：全国的・全世界規模で疾患罹患患者の網羅的分子情報（ゲノムなど）とそれに対応できる臨床表現型（臨床検査、医用画像、処方歴、手術歴、病態経過、転帰など）の収集。疾患ゲノムコホート
- **個別化予防の情報基盤**
 - **Population型BioBank**：健常者前向きコホート。調査開始時の網羅的分子情報（ゲノム）と臨床環境情報（exposome）を集めて、生涯を追跡するゲノム・コホート

• 欧米のBiobank

- **英国 UK biobank**
 - 50万人の健常者。40～69歳（2006-2010, 62M£), 2011-16, 25M£
 - 健診データ（血液・尿・唾液サンプル、生活情報）を集め、健康医療状況を追跡する。
- **英国 Genomics England,**
 - 2013開始、2017年までに10万人のゲノム配列収集。
 - 最初の対象は稀少疾患（患者・家族）、がん患者、最初はEnglandのみ
- **欧州 BBMRI (Biobank/Biomole. Res. Infra.)**
 - 250以上の欧州各国のBioBankを統合
- **オランダ Lifeline**
 - 165000人北部オランダ 2006年開始 30年間の追跡、3世代コホート（世界初）
- **Precision Medicine Initiative Genome Cohort**
 - 100万人のゲノムを集める

国内の主なバイオバンク・ゲノムコホートの状況

我が国における主なバイオバンク・ゲノムコホートを対象者、規模、目的で大別

大規模／多目的

東北メディカル・メガバンク

東北大学・岩手医科大学
2013年～/被災住民8万人+3世代7万人

JPHC(多目的コホート)

国立がん研究センター
1990,93,2011(NEXT)～地域住民/10万人

J-MICC(多施設共同コホート)

愛知がんセンター等、多施設共同研究
2005年～/10万人、愛知がんセ・名大

山形分子疫学コホート 2002年/9100人

久山コホート

追跡率99%・剖検率80%
50年の歴史/8000人九州大学

ながはま0次予防コホート

京都大学 2002年～/9100人

鶴岡メタボロームコホート

鶴岡市・慶応大学 2013年～/10000人

バイオバンク・ジャパン

(BBJ) /東大医科研・理研
2003年～/20万人(第3期～)
47疾患・12医療機関

ナショナルセンターバンク (NCBN) 2012～

- ・国立がん研究センター
- ・国立循環器病研究センター
- ・国立精神・神経医療研究センター
- ・国立長寿医療研究センター
- ・国立国際医療研究センター
- ・国立成育医療研究センター

難病バンク

2009年～医薬基盤研究所(40種以上分譲)

小規模／特定目的(特定疾患)

健
常
者

患
者

Biobankの目的

組合せ特異的遺伝子環境相互作用

Idiosyncratic Effect of Combination of GxE factors

- 遺伝的素因と環境の相互作用
- 相互作用の特異的組合せ効果
 - ハワイの白人、日系人と結腸がん発生
 - **相対リスクの乗算ではない。Idiosyncratic Effect**

		CYP1A2 Phenotype ≤ Median		CYP1A2 Phenotype > Median	
		Likes rare/medium meat	Likes well-done meat	Likes rare/medium meat	Likes well done meat
Non-Smoker	NAT2 Slow	1	1.9	0.9	1.2
	NAT2 Rapid	0.9	0.8	0.8	1.3
Ever-Smoker	NAT2 Slow	1	0.9	1.3	0.6
	NAT2 Rapid	1.2	1.3	0.9	8.8

個別化予防

HCA(ヘテロサイクリックアミン, 肉を高温で焼いた時に生成される発癌物質) HCAを減らすためには、油漬け, 2.電子レンジによる下処理, 3.頻繁に肉を裏返す事が必要

L. Le Marchand, JH. Hankin, LR. Wilkens, et al Combined Effects of Well-done Red Meat, Smoking, and Rapid N-Acetyltransferase 2 and CYP1A2 Phenotypes in Increasing Colorectal Cancer Risk, Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev 2001;10:1259-1266

医療ビッグデータを 巡る状況 (2)

日常的センシング
mHealth, wearable sensing

生涯的Perspectiveへの 健康・疾病概念のパラダイム転換

- <若い人中心－急性期疾患中心>の疾病概念から
- 慢性期疾患中心－「生涯にわたる」健康疾病概念へ
Life-long (course) healthcareの概念
- 医療施設中心（施設医療）→
患者中心・日常生活圏・患者参加型（participatory medicine）

Reactive (対応的)で
Occasional (機会的)な
医療・ケア



Proactive (予見的)で
Life-long (生涯的)な
医療・ケア

生涯型医療・先制医療への転換

生体生理量センサリング

- Quantified Self

- 米国での運動、Wearable Computerと生体センシングを結合して自己の健康・行動をモニターする。世界に広がる

- 東北大学 - 東芝COI



- 「さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己」
 - そのほか Wearable sensor
 - コンティニューアなど幾つかの日常モニタリング, など各種のmHealthのプロジェクト

- 生涯型電子カルテ (EHR/PHR)

- アレルギーなどのリスク情報を追加
 - データ信託銀行と産業界の利用





東北大学COI 「さりげないセンシング」




iPOP (integrated Personal Omics Profiling)

Personal "Omics" Profiling (POP)




統合個別化オミックス
 プロファイルの時系列
 分析 (Fourier分析) に
 より統合オミックスの
 乱れを検知



Integrated Omics clustering




(I) Autocorrelated data clusters



Full Reactome (FI) known pathway map for cluster:




Example pathway: Protein processing in endoplasmic reticulum




Dynamic expression pattern observed in:



Example pathway: Phagosome



Example pathway: Lysosome



Example pathway: Insulin



バイオマーカー 第2世代へ

Predictive Omics Biomarker

液体細胞診 (Liquid Biopsy)

- microRNA, エキソソーム研究
 - 細胞外RNA (exRNA)
 - 唾液検査：慶応先端生命研 東京医大と膵臓がん検出84%
 - 国立がん研究センター：NEDO 5年プロジェクト (79億円)
 - 血中miRNA網羅解析、miRNAチップ、Biobankを利用して臨床関連性を抽出
- 液体細胞診 Liquid Biopsy
 - 循環腫瘍細胞 (CTC)
 - 循環miRNA
 - 循環DNA (無細胞) : ctDNA
 - 循環細胞外小胞 (Exosome)
 - がんメタボローム
- がんのEarly Detection Research Network (EDRN)
 - NIH, exRNAの研究に予算
 - NCIが主導、がんの早期発見、stage Iバイオマーカー

生涯型生体データモニタリング

- センサー群による健康無意識管理
- 先制医療のための基礎データ
 - 健康から疾患発症の過程データ
 - 液性オミックスバイオマーカの可用性
 - PLR(Personal Life Repository)
 - 「生涯データ信託銀行」と産業界の利用
- 参加型医療のための健康医療ビッグデータ

Precision Medicine

「高精度医療」

Obama大統領と Precision Medicine Initiative

- 2015年, 一般年頭教書で発表
- 個別化医療、高精度医療 (precision medicine) の推進
- 100万人のコホート研究 GxE発症相互作用
- 250億円 (215M\$) の予算
 - 130M\$: NIH, 100万人コホートの組織化
 - 70M\$: NCI, がんのドライバー変異
 - 10M\$: FDA, データベース開発
 - 5 M\$: ONC標準規格, 情報 privacy, security

Precision MedicineとPersonalized Medicineはどう違うか

経緯：すでにPrecision medicine は2010年前後から使われていた
“Towards Precision Medicine” (US Nat. Research Council,2011)
表現型から疾患体系からゲノム・オミックス機序からの分類への変革

趣旨：基本は、Personalized Medicine の概念と変わらないが、
目指していたのは診断/治療の個人化ではなく層別化であることを明確化

概念の拡張：Personalized Medicineが標榜された時から10数年経っている

医療ビッグデータ時代の到来による拡張点

(1) 遺伝素因 X 環境(生活習慣)要因のスキーマ重視

SNPや変異だけでなく環境・生活習慣要因(exposome) の重視、疾患発症は2つの要因の相互作用を明快に強調。電子カルテの臨床表現型 (Clinical Phenome)も

(2) 日常生理モニタリング情報の包摂



モバイルヘルス(mHealth)・wearable sensorによる大量継続情報収集の重視

(3) ゲノムコホート・Biobankの重視

Precision Medicineを実現する基礎として、ゲノムコホート/Biobankが必要であることを認識。Real world dataの重視

個別化医療の展開

- 個別化・分子標的創薬
 - 疾患（がん）を分子変異で層別化
 - バイオマーカ（分子変異 genomic biomarker)
 - 基本概念 **Oncogene addiction**
- システム分子医学的疾患認識へ（分子システム）
 - 「がんはパスウェイの病気である」
 - **Pathway Addiction**
 - Panomicsより患者特異的パスウェイ分枝を決定



1. 疾患オミックスプロファイルから
 → 患者特異的分子ネットワーク(個別化医療)の
 調節不全分枝 同定
 Dysregulated pathway/subnetwork の同定

2. パンオミックスによる臨床的実践の戦略

- 遺伝子発現プロファイル 推定法による分子ネットワークの同定 (80%)
- 次世代シーケンシング 転写因子や信号パスウェイスイッチ分子の変異
- リン酸化プロテオーム パスウェイバイオマーカ
リン酸化状況の認識

分子ネットワーク歪構造同定


個人のpanomics1例だけではネットワークは同定できない
臨床表現型と合わせて層別化する。類似症例検索より推測

疾患ネットワーク同定方法論


東京医科歯科大学病院 肝胆膵外科にて肝胆膵外科で手術を受けた40症例

— 予後良好群20例 vs. 予後不良群20例

細胞増殖分子ネットワーク推定
differential branches 増殖系の過剰活性




細胞周期分子ネットワーク推定
differential branches 結果 AurkBを起点としたNW



差異的発現分枝

— 予後不良群に特徴的
— 両者共通
- - - 既知PPIあり





Precision Medicineとは 分子システム医学のことである


断層像
再構成技術



疾患
パンオミクス
プロフィール



スーパー
コンピュータ



逆計算




Figure from: Hanahan and Weinberg, 2000. Cell 100, p. 57-70

合理的な
診断・治療
予後予測

患者特異的分子ネットワーク
調節不全分枝同定



医療ビッグデータ 創薬のパラダイム変換

～RCTからReal World Dataへ～


新しい米国の医療情報システムの概念 「学習する医療システム」

Learning Health System/Rapid Learning

- IOM(Institute of Medicine)のレポート
 - 2007年にEBM/RCT（無作為試験）に変わるパラダイムとして提案

Digital Infrastructure for the Learning Health System: The Foundation for Continuous Improvement in Health and Health Care

Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning Health Care in America




「学習する医療システム」 Learning Health System

新しい生物医学知識が臨床実践に給されるまで17年
臨床データを用いて医療を実施しながら医療を改善

- IOM “Clinical Data as a Basic Staple of Health Learning”
- 医療システムのデジタル化（IT化）は必然の傾向である
- 「ルーチンの医療活動から集められたデータ（形式的臨床研究と違って）がLHSを支える鍵である」
- データを共有することによって学習して医療システムを改善
- RCTは「黄金基準」であるが、通常の医療システムの外で実施されている。医療が実際対象とする患者集団を代表しているのか。
- RCTは時間が掛かり費用もかかる
- 有効な知識の蓄積の速度が加速する

LHSの代表例 BioVU

ゲノム情報と電子カルテ情報を用いた Vanderbilt大学病院の医療情報システム



電子カルテ

Synthetic Derivative : 電子カルテから匿名化臨床表現型のデータベース 230万件。Opt out 形式

バイオバンクと遺伝子解析

BioVU : Synthetic Derivativeと連結可能な Genome DNA情報

VANTAGE Core : 検体17.5万件、血液検からDNA抽出・ゲノム解析、バイオバンク運営

PREDICT : 臨床レベルの遺伝子解析情報により、薬物副作用防止などを実現するシステムを自らの医療システムにより知識抽出して実現する

クロビドグレル（抗血栓剤）の遺伝子多型に関してABCB1, CYP2C19、さらにPON1の多型が知られていたが、ヒトを対象とした臨床実験の報告はなかった。SDから循環器疾患で clopidogrelの投与歴の対象者（ケース群）およびコントロール群を選出。BioVUから遺伝型を決定する。この条件に合致するケース群は255件。解析の結果、CYP2C19*2とABCB1の関与は有意。PON1は非有意が判明した。

新しい臨床研究のパラダイム

Real World BD2K

- 大半のRCTは医療の外に人工的な環境
- 「標本」からの「推測」の概念
- 母集団に近いReal World 医療データが収集可能
⇒データの大規模化の「相転移」
- しかし、新たなパラダイムを構築するまで時間・研究が必要
- 我が国の戦略 段階的移行 BioBankの利用段階



ビッグデータと医療 まとめ

- ゲノム・オミックス医療のビッグデータ
 - 個別化・層別化医療
 - 疾患バイオバンクと統合データベース
 - 層別化特異的パスウェイの同定に基づく医療
 - Precision Medicine ⇒分子システム医療
- 生涯継続的オミックスモニタリング
 - 疾病発症前状態（先制医療状態）の把握
 - 先制医療薬の開発への重点移行
- 遺伝要因と環境生活要因の相互作用
 - 個別化予防・3次予防

Precision Medicine 医学医療の的確性の増大


参加型医療：Intelligent Proactive Consumerの増大

創薬とビッグデータ データ駆動型創薬へ

とくにDrug Repositioningに関して

創薬を巡る状況

- 医薬品の開発費の増大
 - 1 医薬品を上市するのに約700億円
- 開発成功率の減少
 - 2万~3万分の1の成功率
 - とくに非臨床試験から臨床試験への間隙
 - phase II attrition (第2相損耗)
- 臨床的予測性
 - 医薬品開発過程のできるだけ早い段階での、有効性・毒性の予測
- 臨床予測性の向上
 - 罹患者のiPS細胞を使う
 - ヒトのビッグデータを使う



オミックス創薬の原理

- 薬剤特異的遺伝子発現 (Drug-induced SDE)

- CMAP : Connectivity Map

- 薬剤投与による遺伝子発現プロファイルの変化
- 米国 Broad Institute, 1309化合物, MCF7, PC5など5 がんセルライン, 7000 遺伝子発現プロファイル
- Signature (遺伝子発現刻印 : 差別的発現遺伝子)
Signature of Differential gene Expression
- DB利用 : 発現刻印をquery, 順位尺度で類似性の高い順に化合物を提示

- 疾病特異的遺伝子発現(Disease-associated SDE)


- GEO (gene expression omnibus),

- 疾病罹患時の遺伝子発現プロファイルの変化
- 米国NCBI作成・運用 2万5千実験, 70万プロファイル
- ArrayExpressもEBIが作成、サンプル数同程度

本来は、分子ネットワークの疾病/薬剤特異的変化が基本 (第3世代)。

遺伝子発現プロファイル変化

≈分子ネットワーク変化




遺伝子発現プロファイルによる有効性予測

- 遺伝子発現シグネチャ逆位法 (signature reversion)




- 薬剤特異的遺伝子発現シグネチャ
- 疾患特異的遺伝子発現シグネチャ
- 有効性予測**：両者が負に相関する
- Non-parametric な相関尺度で評価

- Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) : ES score
- 対照と比較して順位づけられた遺伝子リストの上位に密集しているかの尺度

- 例：炎症性腸疾患IBDに 抗痙攣剤(topiramate), 骨格筋委縮にウルソール酸





GSEA



遺伝子発現プロファイルによる**毒性予測**

- 連座法 guilt-by-association :
- 薬剤－薬剤間
 - － Connectivity map から薬剤特異的遺伝子発現の薬剤間の類似性をノンパラメトリック親近性尺度 (GSEA) で評価
 - － この類似性のもとに薬剤ネットワーク構築、近隣解析によりDR
 - － 例：抗マラリア剤をクローン病に適応
- 薬剤－疾患間
 - － 薬剤特異的シグネチャと
 - － 疾患特異的シグネチャが
 - － ノンパラメトリック相関 正
 - － **毒性・副作用の予測**



Drug Repositioning



ヒトでの安全性と体内動態が十分に分かっている
既承認薬の標的分子や作用パスウェイなどを、体系的・論理的・網羅的に解析することにより新しい
薬理効果を発見し、その薬を別の疾患治療薬として
開発する創薬戦略

利 点

- (1) 既承認薬なので、ヒトでの安全性や体内動態などが既知で臨床試験で予想外の副作用や体内動態の問題により開発が失敗するリスクが少なく**開発の成功確率が高い**
- (2) 既にあるデータや技術（動物での安全性データや製剤のGMP製造技術など）を再利用することで、**開発にかかる時間とコストを大幅に削減できる**

合理的DRへのアプローチ

- 医薬品中心 Drug-based (drug-centric)
 - 医薬品の構造・特徴の類似性に基づいて別の医薬品の適応を予測
 - ① 化合物の化学的構造・特徴の類似性
 - ② 薬物投与時の遺伝子発現プロファイル
- 疾患中心 Disease-based(disease-centric)
 - 疾患の発症機序の類似性に同一の医薬品が別の疾患の適応を予測
 - ① 疾患原因/感受性遺伝子の共有
 - ② 疾病遺伝子発現プロファイル
 - ③ 疾患を起こす分子ネットワークの類似性
- 両者の融合的アプローチ




疾患ネットワークによるDR

第1段階 疾患ネットワークの構築

- 疾患のゲノム・オミックス機序の類似性をネットワークで表したものの

第2段階 疾患ネットワークによるDR候補疾患の予測

- 既存の<疾患-薬剤>を決め
近傍の疾患をDR候補とする




第3段階 シグネチャ逆位法による有効性・毒性の推定

- シグネチャ逆位法、連座法で有効性、毒性を予測

疾患ネットワークに基づいたDR

- 従来の疾患体系 nosology
 - Linne以降300年に亘って表現型による疾病分類
 - 臓器別・病理形態学別の疾患分類学
- ゲノム・オミックスレベルでの発症機構による疾患分類
 - 発症機構類似性を基準に疾患ネットワーク
 - ゲノム・オミックス医学の疾病概念が基礎



疾患の成立機序における主要機序


- 疾患関連遺伝子型（第1世代型）
 - 原因遺伝子、疾患感受性遺伝子の変異・多型が主要発症機序
- 疾患オミックス型（第2世代型）
 - 疾患オミックスプロファイルの変容が主要発症機序
 - Transdisease omics
- 疾患分子ネットワーク型（第3世代型）
 - 分子ネットワークの歪みが主要発症機序
 - がんなどで遺伝子型（肺腺がん等）でない通常のがん

第1世代型

Diseasomeと疾患遺伝子

- OMIMから 1,284 疾患と 1,777 疾患遺伝子を抽出
- ヒト疾患ネットワーク (HDN)
 - 867疾患は他疾患へリンクを持つ 細胞型や器官に非依存
 - 516疾患が巨大クラスターを形成
 - 大腸がん、乳がんがハブ形成
 - がんはP53 やPTENなどにより最結合疾患 がんなどは後天的変異
 - 疾患を網羅的に見る見方：臓器や病理形態学に非依存
 - リンネ (12疾患群分類) 以来300年続いた分類学を越える
- 疾患遺伝子ネットワーク (DGN)
 - 1377遺伝子は他遺伝子へ結合
 - 903遺伝子が巨大クラスター
 - P53がハブ
- ランダム化した疾患/遺伝子ネットワークに比べ
 - 巨大クラスターのサイズが有意に小さい
- 疾患遺伝子は機能的なモジュール構造
 - 同じモジュールに属する遺伝子は相互作用し
 - 同一の組織で共発現し、同じGOを持つ

疾患ネットワーク Diseasome (Goh, Barabasi et al.)



1つ以上の疾患関連遺伝子を共有する疾患



1つ以上の疾患を共有する疾患関連遺伝子

Kwang-Il Goh*, Michael E. Cusick, David Valle, Barton Childs, Marc Vidal, and Albert-Laszlo Barabasi The human disease network PNAS2007

疾患ネットワーク (HDN)

Nodeの径
 疾患に参与している原因遺伝子の数に比例
リンクの太さ
 疾患間で共有している原因遺伝子の数



a Human Disease Network



疾患遺伝子ネットワーク (DGN)

Nodeの径
 その遺伝子を原因にしている疾患の数に比例
 2つ以上の疾患に参与していると明灰色の遺伝子ノード


b Disease Gene Network



第2世代型


GENOMED (A.Butte et al)

- 遺伝子発現DBのGEO (Gene Expression Omnibus) 利用
 - 約20万のサンプル
- 疾患名は注釈文より用語集UMLSを用いて抽出
- 疾患ごとに多数の遺伝子発現パターンを平均化



Gene-Expression Nosology of Medicine

- 疾患を平均遺伝子発現パターンよりクラスター分類
 - 臓器別疾患分類では予想できない疾患間の親近性
 - 分類項目はサイトカインの遺伝子発現と相関
 - 疾患の再体系化に基づいた医薬の repositioning
- さらに656種類の臨床検査を結合した分析
- 心筋梗塞・デュシャンヌ型筋ジストロフィーに近い



Transcriptional Profiling による疾患ネットワーク

Hu, Agarwal 遺伝子発現プロファイルとGSEA関連尺度によるリンク

疾患 (disease-disease) 645 nodes
 疾患-薬 (disease-drug) 5008 pairs

Solar keratosis 日光性角化症

⇒ cancer(squamous)



Crohn's disease

⇒ マラリア

Hereditary Spastic Paraplegia

(遺伝性痙攣性対麻痺)

⇒bipolar双極性うつ病




カラーはMeSH
 同一カテゴリー

Transcriptional Profiling による 疾患ネットワーク

Disease-drug network


橙色 医薬品
緑色 病気

Tamoxifen (breast cancer)
(負の値をもっている)
⇒ アトピー,
⇒ マスト細胞分泌抑制、
アレルギ抑制
(正の値をもっている)
副作用の予測
⇒ carcinogenic




Transcriptomeの変化をPPIに投影した疾患ネットワーク (Butte)


- 遺伝子発現プロファイルを直接使うのではなく 4620Moduleに分解したPPIネットワークでの疾患での平均発現変化をつかう
 - 遺伝子発現プロファイルより疾患によって 変化するmoduleを調べる 病気に対するPPIの応 マラリアとクローン病
 - moduleの遺伝子の変化を平均して遺伝子の代わり moduleの発現平均スコアを用いる
- 疾患の大半を占める <共通疾患状態シグネチャ>



[A] Hierarchical relationships between diseases




[B] All significant disease correlations




疾患ネットワークとDrug Projection Map

DR informaticsの構築


第1世代疾患ネット (原因遺伝子親近性)



第2世代疾患ネット (OmicsProfile親近性)




第3世代疾患ネット (Pathway親近性)




統合化

薬剤



疾患ネットワーク

薬剤ネットワーク



疾患ネットワーク

ビッグデータとprecision medicineによる医療と創薬の将来

- 網羅的分子情報を含めた医療ビッグデータの増加による医療の的確性の増大
 - 多様な個別化・層別化パターンの詳細化
 - 診断・治療の的確性の上昇
- 臨床医学知識獲得・創薬のパラダイム変換
 - 医療ビッグデータが機序情報を含むため
 - Real Word Dataに基づいた知識獲得 (BD 2 K)
 - まずはゲノムコホート/Biobankの創薬過程での利用、その後、LHSへ

ご清聴ありがとうございました

